

**Tableau 15** : Etudes sélectionnées (publiées depuis 1990, avec plus de 500 cas et analyse multivariée),  
IMC : indice masse corporelle

<i>Détails de l'étude</i>	<i>Initiation de l'allaitement</i>	<i>Durée de l'allaitement</i>	<i>Facteurs étudiés</i>
Norvège, étude prospective des naissances consécutives dans un centre, 1192 cas, 1981-1982 (22)	Non étudié	<p><b>Facteurs associés au risque d'arrêter avant 6 mois :</b></p> <p>Mère non mariée : <b>1.46 (1.12-1.90)</b></p> <p>Mère &lt; 21 ans : <b>1.53 (1.13-2.07)</b></p> <p>Né entre 21h et 24h : <b>1.37 (1.05-1.78)</b></p> <p>Poids de naissance (par 100g) : <b>0.98 (0.96-0.99)</b></p> <p>Le bébé est un garçon : 1.22 (0.99-1.49)</p> <p>Yeux purulents : 1.16 (0.89-1.50)</p>	Sexe du nourrisson, poids de naissance, être un jumeau, séjour à l'hôpital > 7 jours, âge maternel, parité, statut marital, mode d'accouchement, heure de la journée et jour de la semaine
Australie, étude prospective de cohorte avec échantillon de la communauté, 870 premiers nés, 1984-1985 (8)	Non étudié	<p>Primipare : 0.88 (0.69-1.13)</p> <p><b>Facteurs associés avec un risque d'une durée courte d'allaitement :</b></p> <p>Tabagie (10 cigarettes vs non-fumeurs) : <b>2.48 (1.92-3.13)</b></p> <p>Age maternel (30 ans vs 20 ans) : <b>0.45 (0.32-0.65)</b></p> <p>Score d'emploi de la mère (&gt;4 vs &lt;4) : <b>1.60 (1.18-2.18)</b></p> <p>Corpulence (IMC&gt;26 vs &lt;26) : <b>1.60 (1.18-2.18)</b></p> <p>Laps temps avant 1<sup>ère</sup> tétée (12 h vs &lt; 1 h) : <b>1.37 (1.03-1.82)</b></p> <p><b>Facteurs associés avec la probabilité d'allaiter plus de six mois :</b></p> <p>Allaitement complet durant le premier mois après la naissance : <b>3.49 (2.64-4.62)</b></p> <p>Non fumeur durant le post-partum : <b>1.96 (1.43-2.67)</b></p> <p>Consistance entre intention prénatale pour allaiter et comportement en post-partum : <b>1.68 (1.31-2.16)</b></p> <p>Participation à des séances d'information : <b>1.46 (1.14-1.88)</b></p> <p>Retour au travail retardé : <b>1.34 (1.23-1.47)</b></p> <p>Poids de naissance plus grand : <b>1.13 (1.05-1.23)</b></p> <p>Age maternel plus élevé : <b>1.06 (1.03-1.07)</b></p>	Sexe, poids de naissance, score d'emploi du père, score d'emploi de la mère, âge et taille de la mère, poids avant la grossesse, nombre de cigarettes fumées, changement d'appétit avec l'allaitement.
Etats-Unis, enquête nationale 1988 sur la santé mère-bébé (échantillonnage systématique et stratifié selon poids de naissance et origine ethnique), 2372 cas, 1989-1991 (10)	Non étudié	<p><b>Facteurs associés avec la probabilité d'allaiter plus de six mois :</b></p> <p>Allaitement complet durant le premier mois après la naissance : <b>3.49 (2.64-4.62)</b></p> <p>Non fumeur durant le post-partum : <b>1.96 (1.43-2.67)</b></p> <p>Consistance entre intention prénatale pour allaiter et comportement en post-partum : <b>1.68 (1.31-2.16)</b></p> <p>Participation à des séances d'information : <b>1.46 (1.14-1.88)</b></p> <p>Retour au travail retardé : <b>1.34 (1.23-1.47)</b></p> <p>Poids de naissance plus grand : <b>1.13 (1.05-1.23)</b></p> <p>Age maternel plus élevé : <b>1.06 (1.03-1.07)</b></p>	Intervalle (temps entre naissance et collection des données), âge maternel, parité, âge gestationnel au début des séances d'information, âge gestationnel à la naissance, poids de naissance, situation conjugale, participation à des séances d'information, faire partie du programme WIC, vivre avec son partenaire durant la grossesse, tabagie post-partum, éducation, origine ethnique, intention prénatale d'allaiter complètement ou partiellement et comportement en post-partum, retour au travail en post-partum, date du retour au travail

Nouvelle-Zélande, étude prospective randomisé sur un échantillon, 1529 cas, autour de 1991 (16)	<b>Facteurs associés avec « pas d'allaitement exclusif à la sortie de la maternité » :</b>	<b>Facteurs associés avec le risque d'une durée faible d'allaitement :</b>	Statut d'emploi, sexe du nourrisson, origine ethnique, âge de la mère à la fin des études, âge de la mère à sa première grossesse, âge de la mère à la naissance, parité, âge gestationnel à la première séance d'information anténatale, poids de naissance, tabagie maternelle, nourrisson admis en soins intensifs néonatal, partage du lit, utilisation de sucette.
	Grossesse gémellaire : <b>3.02 (1.31-6.96)</b>	Pas de partage du lit ces deux dernières semaines : <b>2.86 (2.19-3.72)</b>	
	Origine Iles Pacifique : <b>2.33 (1.47-3.70)</b>	Fumer plus de 20 cigarette par jour : <b>2.22 (1.49-3.30)</b>	
	Pas partage du lit les 15 derniers jours : <b>2.29 (1.66-3.16)</b>	Fumer entre 10 et 20 cigarettes : <b>1.62 (1.12-2.36)</b>	
	Sucette utilisée fréquemment les 15 derniers jours : <b>2.25 (1.54-3.28)</b>	Sucette utilisée fréquemment les 15 derniers jours : <b>2.22 (1.78-2.78)</b>	
	Poids de naissance < 2500g : <b>1.94 (1.06-3.54)</b>	Sucette utilisée occasionnellement les 15 derniers jours : <b>1.87 (1.44-2.42)</b>	
	Fumer plus de 20 cigarettes par jour : <b>1.90 (1.20-3.02)</b>	Grossesse gémellaire : 1.74 (1.00-3.04)	
	Ne pas assister à la préparation prénatale : <b>1.52 (1.11-2.08)</b>	Age de la mère < 20 ans à la première grossesse : <b>1.46 (1.03-2.06)</b>	
	Age de la mère < 20 ans à la première grossesse : <b>1.42 (1.02-1.97)</b>	Statut d'emploi V-VI : <b>1.35 (1.07-1.69)</b>	
		Ne pas assister à la préparation prénatale : <b>1.25 (1.01-1.55)</b>	
Angleterre, étude prospective, échantillon randomisé, 700 cas, 1990-1991 (18)	<b>Facteurs associés avec « pas d'allaitement exclusif à la sortie de la maternité » :</b>	<b>Facteurs associés avec le risque d'une durée faible d'allaitement :</b>	Occupation, statut marital, âge de la mère à la fin de ses études, âge de la mère à la naissance, âge de la mère à la première grossesse, parité, âge gestationnel au moment de la première séance d'information, participation à des séances prénatales, méthode d'accouchement, sexe du nourrisson, poids de naissance, origine ethnique, naissance multiple, admission en service néonatal, et prise de café, alcool, partage du lit et sucette les 15 derniers jours
	Mère ayant fini les études à 16-17 ans : <b>2.17 (1.13-4.17)</b>	Utilisation de la sucette les deux dernières semaines : <b>2.64 (1.81-3.84)</b>	
	Mère n'ayant pas assisté aux séances de préparation : <b>2.44 (1.34-4.42)</b>	Age de la mère à la fin des études < 16 : <b>2.24 (1.03-4.90)</b>	
	Mère n'ayant pas partagé le lit avec son enfant après : <b>2.09 (1.25-3.49)</b>	16-17 : <b>1.96 (1.27-3.04)</b> + de 18 : 1.00	
	Utilisation ultérieure de sucette : <b>1.85 (1.11-3.06)</b>	Mère ne partageant pas son lit durant les deux dernières semaines : <b>1.93 (1.33-2.79)</b>	
		<i>Nombre de cigarettes fumées les deux dernières semaines</i>	
		Aucune : 1.00	
		1-9 : 1.29 (0.71-2.30)	
		10-19 : 1.56 (0.81-2.97)	

<i>Détails de l'étude</i>	<i>Initiation de l'allaitement</i>	<i>Durée de l'allaitement</i>	<i>Facteurs étudiés</i>
Canada, enquête santé dans l'Ontario, multi-étape, stratification de l'échantillon, femmes ayant donné naissance les 5 dernières années, 3120 cas, 1990 (naissances entre 1986 et 1990) (14)	<p><b>Facteurs associés avec l'initiation de l'allaitement :</b></p> <p><b>Lieu de naissance</b></p> <p>US/Canada : 0.57 (0.29-1.11)</p> <p>UK/Europe : 0.53 (0.24-1.16)</p> <p>Asie : 0.35 (0.11-1.12)</p> <p>Carraïbes/autre : 1.00</p> <p><b>Tabagie</b></p> <p>Avant : 1.00</p> <p>Jamais : 0.71 (0.48-1.05)</p> <p>Tous les jours : <b>0.57 (0.38-0.85)</b></p> <p><b>Emploi</b></p> <p>A un emploi : 1.00</p> <p>Auparavant : <b>0.67 (0.50-0.88)</b></p> <p>Jamais : 1.12 (0.69-1.81)</p> <p><b>Langue parlée</b></p> <p>Anglais : 1.00</p> <p>Français : <b>0.52 (0.28-0.95)</b></p> <p>Autre : 1.01 (0.46-2.23)</p> <p><b>Statut marital</b></p> <p>Marié : 1.00</p> <p>Célibataire : <b>0.57 (0.40-0.81)</b></p> <p><b>Education</b></p> <p>&lt; secondaire : 0.35</p> <p>études secondaires terminées : <b>0.41 (0.31-0.56)</b></p> <p>études supérieures : 1.00</p> <p><b>Age maternel</b></p> <p>&lt; 25 : 0.81 (0.56-1.13)</p> <p>26-30 : 1.01 (0.74-1.37)</p> <p>&gt; 30 : 1.00</p>	<p><b>Facteurs associés avec une durée d'allaitement d'au moins 4 mois :</b></p> <p><b>Statut d'emploi</b></p> <p>Travail : <b>0.66 (0.48-0.92)</b></p> <p>Auparavant : 1.15 (0.54-2.43)</p> <p>Jamais : 1.00</p> <p><b>Tabagie</b></p> <p>Jamais : 0.78 (0.54-1.13)</p> <p>Tous les jours : <b>0.59 (0.38-0.91)</b></p> <p>Auparavant : 1.00</p> <p><b>Langue parlée</b></p> <p>Français : <b>0.24 (0.09-0.65)</b></p> <p>Autre : <b>0.38 (0.21-0.70)</b></p> <p>Anglais : 1.00</p> <p><b>Education</b></p> <p>&lt; secondaire : <b>0.53 (0.36-0.79)</b></p> <p>étude secondaires terminées : 0.80 (0.56-1.16)</p> <p>études supérieures : 1.00</p> <p><b>Age maternel</b></p> <p>&lt; 25 : <b>0.50 (0.34-0.75)</b></p> <p>26-30 : 0.76 (0.56-1.05)</p> <p>&gt; 30 : 1.00</p> <p><b>Bien-être</b></p> <p>Bas : <b>0.65 (0.48-0.89)</b></p> <p>Médium/haut : 1.00</p>	<p>Année de naissance du nourrisson, âge de la mère au moment de la naissance, situation conjugale, éducation, revenu du foyer, lieu de résidence, langue parlée à la maison, lieu de naissance de la mère, statut socioéconomique (type d'emploi), source de revenu (salaire vs allocations), consommation actuelle d'alcool, de tabac, perception personnelle de bien-être</p>